


Impfkalender ¹

Für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

In diesem Impfkalender sind den empfohlenen Impfungen die Impftermine zugeordnet. Informationen über die zu verhütende Krankheit und den Nutzen der Impfung erhalten Sie von Ihrem behandelnden Arzt / Ihrer Ärztin und im Gesundheitsamt. Dort werden auch Ihre Fragen zur Impfung, zum Impfstoff, zu Kontraindikationen und möglichen Impfreaktionen beantwortet. Nutzen Sie Arztkonsultationen, damit der Impfschutz anhand des Impfausweises überprüft und vervollständigt werden kann.

Empfohlenes Impfalter	G E B U R T	Alter in Monaten				Alter in Jahren					
		2	3	4	11 - 14	15 - 23	5 - 6	9 - 11	12 - 17	ab 18	ab 60
Zeitgleich mit den Früh- erkennunguntersuchungen		U3 - U4	U4	U4	U6	U7	U9		J1		
Impfung gegen		G = Grundimpfschutz (bis zu vier Teilimpfungen)				A = Auffrischungsimpfung (bis zu zwei Teilimpfungen)			S = Standardimpfung		
Diphtherie		G 1	G 2	G 3	G 4		A 1	A 2	A		
Tetanus (Wundstarrkrampf)		G 1	G 2	G 3	G 4		A 1	A 2	A		
Pertussis (Keuchhusten)		G 1	G 2	G 3	G 4		A 1	A 2	A ²		
Haemophilus influenzae Typ b		G 1	(G 2) ⁴	G 3	G 4				A		
Poliomyelitis (Kinderlähmung)		G 1	(G 2) ⁴	G 3	G 4			A	G ⁵		
Hepatitis B		G 1	(G 2) ⁴	G 3	G 4			G	G ⁵		
Masern, Mumps, Röteln					G 1	G 2			S ³		
Varizellen (Windpocken)					G 1	G 2		Ungeimpfte ohne Varizellenanamnese			
Pneumokokken		G 1	G 2	G 3	G 4				S		
Meningokokken					G (ab 12 Monate)						
Saisonale Grippe (Grippe)							S ⁵			S	
Vorstufen von Gebärmutter- halskrebs durch HPV								S für Mädchen			
Rotavirus		G 1 - G 2 (- G 3) ^{5,6} (7. bis vollendete 26. Lebenswoche)									

¹) Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut, Stand: Juli 2011, und öffentlich empfohlene Schutzimpfungen im Land Brandenburg <http://www.rki.de> > Infektionsschutz > Impfen > Impfeempfehlungen

²) Für alle Erwachsenen empfiehlt die STIKO die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap-Kombinationsimpfung zu verabreichen (bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung)

³) Nach 1970 geborene ungeimpfte bzw. in der Kindheit nur einmal geimpfte Personen >= 18 Jahre oder nach 1970 geborene Personen >= 18 Jahre mit unklarem Impfstatus erhalten einmalig eine Impfung gegen Masern, vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff

⁴) Die Dosis kann bei monovalenter Anwendung oder bei Kombinationsimpfstoffen ohne Pertussiskomponente entfallen

⁵) Insbesondere vor dieser Impfung sollte die Kostenübernahme geprüft werden

⁶) Die Anzahl der Rotavirus-Impfungen ist abhängig vom verwendeten Impfstoff (Herstellerempfehlung beachten)